

定期予防接種スケジュール

名前 \_\_\_\_\_

生年月日 \_\_\_\_\_

五種混合 接種者用

記入例 7月10日生まれの場合

2 か 月
(9/10)
①
9/15

・「〇か月」の下に月齢ごとの日付を書いておきましょう。

・実際に接種した日を記録しておきましょう。

ワクチン名		0 か 月	1 か 月	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	12 か 月	1 歳 か 月	2 歳 か 月	3 歳 か 月	4 歳 か 月	5 歳 か 月	6 歳 か 月	1 1 歳 か 月	2 歳	2 歳 か 月	1 2 歳 か 月	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳 以上	
不活化 ワクチン	小児用 肺炎球菌	(/)	(/)	①	②	③								④																			
不活化 ワクチン	B型肝炎			①	②				③																								
経口生 ワクチン	ロタリッ クス	生後6週から		①	②																												
	ロタテッ ク	生後6週から		①	②	③																											
不活化 ワクチン	五種混合			①	②	③								④																			
注射生 ワクチン	結核 (BCG)						①																										
注射生 ワクチン	麻しん 風しん 混合													①																			
注射生 ワクチン	水痘												①								②												
不活化 ワクチン	日本脳炎																							①	②	③							④9~12歳
不活化 ワクチン	子宮頸 がん (HPV)																																①②③

生後24週に至る日  
まで接種可能

生後32週に至る日  
まで接種可能

二種混合：  
小学5年生～6年生で  
追加接種

麻しん風しん  
混合2期：  
小学校就学前  
の1年間  
(年長児相当)

子宮頸がん (HPV)：小学6年生～高校1年生相当の女子

●同じ予防接種との標準的な接種間隔・回数

小児用肺炎球菌※	初回接種	27日以上の間隔を置いて3回
	追加接種	生後12か月以降かつ初回免疫（3回目）終了後、60日以上の間隔を置いて1回
B型肝炎	2回目	1回目から27日以上の間隔を置いて1回
	3回目	1回目から139日以上、2回目から6日以上の間隔を置いて1回
ロタウイルス	2回目	1回目から27日以上
	3回目	2回目から27日以上
五種混合	初回接種	20～56日までの間隔を置いて3回
	追加接種	1期初回（3回目）終了後、6～18か月までの間隔を置いて1回
水痘	1回目	生後12～15月に達するまでの期間に1回
	2回目	1回目終了後、6～12月までの間隔を置いて1回
日本脳炎	1期初回	6～28日までの間隔を置いて2回
	1期追加	1期初回（2回目）から概ね1年後に1回

※小児用肺炎球菌は、生後2か月から7か月に至るまでに接種を開始した場合の接種間隔・回数です。

- ◆法律等により、予防接種の内容に変更が生じる可能性があります。
- ◆日本脳炎2期・二種混合・子宮頸がん (HPV)の対象時には、個別通知します。

標準的な接種期間および接種可能な期間で受ける場合は、原則として無料（公費負担）です。

標準的な接種期間      接種可能な期間

●異なった種類の注射生ワクチンを接種する場合の間隔

ワクチンの種類	ワクチン名	他の生ワクチンを接種する時の間隔
注射生ワクチン	結核（BCG）、麻しん風しん混合、水痘、おたふくかぜなど	27日（4週間）以上おく

令和8年4月1日現在