

★小児用肺炎球菌の受け方【接種開始時期によって接種回数異なるので、注意してください。】

初回接種開始時	接種回数	標準的な接種間隔			
		初回免疫 (1回目)	初回免疫 (2回目)	初回免疫 (3回目)	追加免疫
生後2～7か月に 至るまで	4回	1回目	1回目から27日以上 (4週間以上) (※2)	2回目から27日以上 (4週間以上) (※2)	初回免疫(3回目)終了後、 60日以上の間隔をあげ、 生後12か月以降
生後7～12か月に 至るまで	3回	1回目	1回目から27日以上 (4週間以上) (※3)	—	初回免疫(2回目)終了後、 60日以上の間隔をあげ、 生後12か月以降
生後12～24か月に 至るまで	2回	1回目	—	—	初回免疫(1回目)終了後、 60日以上
生後24～60か月に 至るまで	1回	1回	—	—	—

(※2) 生後24か月に至るまでに行い、それを超えた場合は接種しないでください(追加免疫は接種可能です)。

また、初回免疫(2回目)は生後12か月に至るまでに行い、それを超えた場合は、初回免疫(3回目)は接種しないでください(追加免疫は接種可能です)。

(※3) 生後24か月に至るまでに行い、それを超えた場合は接種しないでください(追加免疫は接種可能です)。