



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期										
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上			
B型肝炎	ユニバーサル	不活化		①	②				③		(注1)															
	母子感染予防	不活化	①	②				③																		
ロタウイルス	1価	生		①	②	(注2)																				
	5価	生		①	②	③	(注3)																			
肺炎球菌 (PCV13、PCV15)		不活化		①	②	③					④															(注4)
5種混合 (DPT-IPV-Hib)		不活化		①	②	③					④						7.5歳まで									
3種混合 (DPT)		不活化															①								② 11-12歳	(注5) (注6)
2種混合 (DT)		不活化																							① 11歳	12歳
ポリオ (IPV)		不活化															①									(注7)
インフルエンザ菌b型 (ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合		不活化		①	②	③					④															(注8)
4種混合 (DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合		不活化		①	②	③					④						7.5歳まで									
BCG		生						①																		
麻疹・風疹混合 (MR)		生										①						②								(注9)
水痘		生									①		②													(注10)
おたふくかぜ		生									①							②								(注11)
日本脳炎		不活化									生後6か月から接種可能			①	②	③	7.5歳まで						④ 9-12歳			
インフルエンザ		不活化									生後6か月から接種可能			毎年 (10、11月などに) ① ②											13歳以上①	
新型コロナウイルス		mRNA																								
ヒトパピローマウイルス (HPV)	9価	不活化																			(注12)	小6	中1①② (注13)		中2～高1相当	(注14)
	2価・4価	不活化																			(注12)	小6	中1①②③ (注13)		中2～高1相当	(注14)
ワクチン	種類	生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上			

定期接種の推奨期間
定期接種の接種可能な期間
任意接種の推奨期間
任意接種の接種可能な期間
添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
健康保険での接種時期